



# amarillo ENDODONTICS

Kirk A. Coury, DDS, MS • James C. Douthitt, DDS, MS

10 Care Circle, Suite A • Amarillo, Texas 79124

806.354.2424 • 1.866.593.ENDO • Fax 806.354.9479 • [www.amarilloendo.com](http://www.amarilloendo.com)

## ROOT CANAL THERAPY

(instructions available at [www.amarilloendo.com](http://www.amarilloendo.com))

Should you experience discomfort after treatment, do not be alarmed – this is normal and is part of the healing process. It is not uncommon for your tooth to be sore when you touch it, brush it, and chew with it. This may last for 4-6 weeks, although a progressive improvement should be noticed.

To minimize your discomfort, it is important to take 400-600mg (2-3 pills) of ibuprofen every 4-6 hours for the first 3 days after treatment. If ibuprofen alone doesn't alleviate your symptoms, take 1-2 extra-strength Tylenol along with the ibuprofen. If you cannot take ibuprofen, then take 2 extra-strength Tylenol every 4-6 hours. Rinsing the area with a tablespoon of salt in comfortably hot water 3-4 times daily can also help reduce inflammation and swelling. Try to avoid skipping a dose during the 3 days post treatment. The use of an ice pack during the first twelve hours after treatment can be beneficial.

Swelling is unusual. If you have been prescribed an antibiotic, be sure and take it as prescribed. If none was prescribed, and swelling occurs, please contact our office.

After treatment, your tooth will require a crown, if one is not already present. For the best long-term success of the treated tooth, it is recommended that you see your general dentist as soon as possible after your root canal has been completed. Failure to do this can result in the loss of your treated tooth.

Should you experience any problems with your tooth, please call our office for an evaluation. There is no additional charge for this check-up.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to call this office and the doctor on call will return your call as soon as possible.

**806.354.2424**



# amarillo ENDODONTICS

Kirk A. Coury, DDS, MS • James C. Douthitt, DDS, MS

10 Care Circle, Suite A • Amarillo, Texas 79124

806.354.2424 • 1.866.593.ENDO • Fax 806.354.9479 • [www.amarilloendo.com](http://www.amarilloendo.com)

## TERAPIA DE ENDODONCIA

Si usted experimenta malestar después del tratamiento, no se alarme - esto es normal y es parte del proceso curativo. No es raro que el diente le duela al tocarlo, cepillarlo y al masticar con él. Esto puede durar por 4-6 semanas, aunque una mejora progresiva debe ser notada.

Para minimizar su malestar, es importante tomar 400-600mg de ibuprofeno cada 4-6 horas durante los primeros 3 días después del tratamiento. Si el ibuprofeno por sí solo no alivia sus síntomas, tome 1-2 Tylenol de fuerza extra junto con el ibuprofeno. Si usted no puede tomar ibuprofeno, entonces tome 2 Tylenol de fuerza extra cada 4-6 horas. Enjuagar el área con una cucharada de sal en agua cómodamente caliente 3-4 veces al día también puede ayudar a reducir la inflamación y la hinchazón. Trate de evitar omitir una dosis durante los 3 días posteriores al tratamiento.

Hinchazón es inusual. Si le han recetado un antibiótico, asegúrese de tomarlo como se le recetó. Si no se le recetó ninguno, y se presenta hinchazón, por favor comuníquese con nuestra oficina.

Después del tratamiento, su diente requerirá una corona, si uno no está ya presente. Para el mejor éxito a largo plazo del diente tratado, se recomienda que usted vea a su dentista general tan pronto como sea posible después de que su conducto radicular haya sido completado. El no hacer esto puede resultar en la pérdida de su diente tratado.

Si experimenta algún problema con su diente, por favor llame a nuestra oficina para una evaluación. No hay ningún cargo adicional por este chequeo.

Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor no dude en llamar a esta oficina y el dentista de guardia le devolverá su llamada tan pronto como sea posible.

**806.354.2424**